Wpływ preparatu **Prolibid Femina®** na jakość życia seksualnego u kobiet.

Violetta Skrzypulec-Plinta, Agnieszka Drosdzol-Cop
Katedra Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Tomasz Paszkowski
III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Cel i opis badania

Celem przeprowadzonego badania była ocena wpływu miesięcznej terapii preparatem **Prolibid Femina®** u pacjentek, u których stwierdzono obniżone libido. Do badania zakwalifikowano 50 kobiet w wieku 25-50 lat aktywnych seksualnie, bez schorzeń ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca, czy nadciśnienie. Pacjentki przyjmowały preparat 1 saszetkę na dobę przez okres 1 miesiąca w godzinach porannych, po posiłku. Badanie obejmowało 2 wizyty – przed kuracją oraz po 4 tygodniach kuracji.

Ocenie poddano: poziom satysfakcji kobiet ze stosowania preparatu **Prolibid Femina®**; jakość życia seksualnego na podstawie standaryzowanego kwestionariusza Female Sexual Function Index – FSFI; ogólną satysfakcję seksualną, bazując na subiektywnej 5-punktowej skali analogowej VAS.

Wyniki badań

1. Wzrost pożądania (zwiększona ochota na seks) po zastosowaniu preparatu



TAK
78%

NIE
22%

2. Okres czasu, po którym pacjentki odczuły efekty terapii



3. Wzrost aktywności seksualnej po zakończeniu terapii



TAK
82%

NIE
18%

4. Wzrost poziomu satysfakcji zbliżeń intymnych



5. Wzrost ilości zbliżeń intymnych po zakończeniu terapii



6. Wzrost intensywności doznań intymnych

7. Wzrost częstotliwości osiągania orgazmu i zwiększenia fantazji seksualnej

Wzrost częstotliwości osiągania orgazmu



TAK 64% NIE 36%

Zwiększenie fantazji seksualnej



TAK 80% NIE 20%

8. Wzrost chęci na zbliżenie z partnerem



Odsetek pacjentek z istotnymi klinicznie zaburzeniami seksualnymi (FSFI < 26,55 = female sexual dysfunction [FSD] - różnica znamienna statystycznie (p=0,021).



Ocena jakości życia seksualnego kobiet przed rozpoczęciem i po zakończeniu terapii preparatem prolibid femina® (I vs. II wizyta; n = 50).

Jakość życia seksualnego		Mediana	Minimum	Maksimum	p*
FSFI – total	I wizyta	21,30	7,20	30,00	<0,001
	II wizyta	27,60	9,30	34,60	
FSFI – pożądanie	I wizyta	3,60	1,20	4,80	0,007
	II wizyta	4,20	1,80	6,00	
FSFI – podniecenie	I wizyta	3,00	1,20	5,10	<0,001
	II wizyta	4,50	1,30	5,70	
FSFI – lubrykacja	I wizyta	3,60	1,50	5,10	<0,001
	II wizyta	4,80	1,80	5,70	
FSFI – orgazm	I wizyta	3,60	1,20	5,20	<0,001
	II wizyta	4,40	1,60	6,00	
FSFI– satysfakcja	I wizyta	3,60	1,20	4,80	<0,001
	II wizyta	4,20	1,20	5,60	
FSFI– dolegliwości bólowe	I wizyta	3,60	1,60	5,20	0,02
	II wizyta	4,00	1,60	5,60	
Ogólna satysfakcja seksualna – skala analogowa	I wizyta	2,0	1,0	5,00	<0,001
	II wizyta	4,0	1,0	5,00	

* Test kolejności par Wilcoxona